Inserm
La science pour la santé
From science to health

CONSIGNE EN CAS DE PRESENCE D'UNE PERSONNE PRESENTANT DES SYMPTOMES

En cas de personne présentant des symptômes sur le lieu de travail.

- Isoler la personne et contacter le Samu (15).
- Lui faire porter un masque du type chirurgical.
- Éviter tout contact étroit.
- Lister les personnes qui l'ont côtoyée de façon rapprochée (1 mètre) et prolongée (+ 15 min) depuis l'apparition des symptômes et dans les 24 heures qui précèdent.
- Identifier les locaux fréquentés depuis la prise de poste.
- Éloigner les autres personnes présentes.

La personne qui porte assistance se protège.

- Porter une visière de protection, des gants jetables et un masque chirurgical ou FFP2.
- Se laver les mains avec eau-savon ou lotion hydro alcoolique.
- Conserver des lingettes désinfectantes ou équivalent pour nettoyer les surfaces en contact.
- Se doter d'un sac à déchets.

En attendant la désinfection de la zone et avant de se déséquiper, la personne qui porte assistance s'assure de :

- Signaler et matérialiser chaque surface qui a été souillée.
- Déterminer les installations à neutraliser (climatisation, ventilation, escaliers…).
- Condamner les locaux fréquentés par la personne malade tant qu'ils n'ont pas été désinfectés.

La personne qui a porté assistance se déséquipe.

- Se munir d'un sac.
- Retirer sa visière de protection.
- Retirer le masque.
- Retirer les gants en veillant à ne pas toucher la surface extérieure.
- Mettre le tout dans un sac plastique et le fermer.
- Placer ce sac dans un deuxième sac qu'elle ferme à son tour.
- Abandonner tout sur place jusqu'à la désinfection.
- Se frictionner les mains avec la solution hydro alcoolique